

Su Diario de Tratamiento de RYTARY®



Seguimiento de su medicación y avances

RYTARY es diferente a otros medicamentos que usted haya probado para la enfermedad de Parkinson, y la experiencia de cada persona con RYTARY es única. A algunas personas la primera dosis de RYTARY les funciona perfectamente. Pero es posible que otras necesiten que el profesional médico ajuste su dosis. Por eso es importante que lleve un control de cómo se siente mientras toma RYTARY.

¿Cómo sabe si necesita ajustar su dosis?

La respuesta rápida es la siguiente: su cuerpo se lo dirá. Por eso es tan importante escucharlo y poner atención a lo que sucede después de cada dosis. Por ejemplo, deberá informar a su profesional médico si usted tiene:

- Periodos "OFF" muy largos
- Una demora del periodo "ON"
- Mucha disquinesia

Para simplificar el proceso de seguimiento de su reacción a RYTARY, desarrollamos el Diario de tratamiento de RYTARY. En las siguientes páginas encontrará varios de estos diarios en blanco.

Hacer un seguimiento de sus avances con esta herramienta es fácil. Cada vez que tome RYTARY, simplemente registre (o pídale a su cuidador que registre) la siguiente información:

- Cuándo la tomó
- Cuánto tomó
- Sus comidas
- Cuando experimente periodos "OFF", periodos "ON", disquinesia u otros síntomas

Asegúrese de completar cada página del diario de tratamiento según las instrucciones anteriores y de compartirlo con su profesional médico en su próxima cita. Y recuerde guardar este PDF en su fondo de pantalla para que pueda encontrarlo fácilmente e imprimir páginas adicionales del diario, según sea necesario.

Ante cualquier inconveniente, llame a su profesional médico de inmediato.

INDICACIÓN

Las cápsulas de liberación prolongada RYTARY (carbidopa y levodopa) son un medicamento recetado que contiene una combinación de carbidopa y levodopa para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Parkinson ocasionada por una infección o inflamación del cerebro, o síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson que pueden ser causados por envenenamiento con monóxido de carbono o manganeso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

RYTARY no debe tomarse con los medicamentos antidepresivos conocidos con el nombre de inhibidores no selectivos de la monoamino oxidasa (MAO), ya que tomar estos dos medicamentos con una diferencia de dos semanas entre sí puede elevar la presión arterial.

RYTARY podría causarle adormecimiento mientras realiza sus actividades habituales, incluso sin previo aviso, y hasta un año después de haber comenzado RYTARY. Esto podría afectar su capacidad para conducir u operar una máquina. No realice ninguna actividad para la que deba estar alerta hasta que conozca los efectos que RYTARY produce en usted.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas siguientes y la [Información de prescripción médica completa](#).

RYTARY®
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

Fecha: _____ A. M. /P. M.

Hora	Dosis de RYTARY	Comida	Sueño	Periodo "off"	Periodo "on"	Disquinesia	Otros síntomas
12							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Si tiene preguntas o inquietudes al completar este diario, llame a su profesional médico de inmediato.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas siguientes y la [Información de prescripción médica completa](#).

RYTARY
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

Fecha: _____ A. M. /P. M.

Hora	Dosis de RYTARY	Comida	Sueño	Periodo "off"	Periodo "on"	Disquinesia	Otros síntomas
12							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Si tiene preguntas o inquietudes al completar este diario, llame a su profesional médico de inmediato.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas siguientes y la [Información de prescripción médica completa](#).

RYTARY
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Informe a su profesional médico si tiene alguna enfermedad coronaria, en especial si ha sufrido un ataque cardíaco o siente latidos del corazón irregulares; si experimenta alucinaciones, pensamientos y conductas anormales (tales como sospecha excesiva, creencias en cosas que no son reales, confusión, agitación, comportamiento agresivo y pensamiento desorganizado); si siente deseos intensos de apostar, tener relaciones sexuales u otros deseos intensos así como la incapacidad de controlar estos deseos; si comienza a realizar movimientos involuntarios anormales o si estos se agravan durante el tratamiento con RYTARY; o si tuvo úlcera péptica o glaucoma.

Los efectos secundarios más frecuentes que pueden ocurrir con RYTARY son náuseas, mareos, dolor de cabeza, insomnio, sueños anormales, sequedad bucal, movimientos anormales involuntarios, ansiedad, estreñimiento, vómitos y baja presión arterial al levantarse.

Algunos pacientes que toman RYTARY han experimentado pensamientos suicidas o han intentado suicidarse. Infórmele a su profesional médico si tiene pensamientos suicidas o si ha intentado suicidarse.

Infórmele a su profesional médico si queda embarazada o si tiene pensado quedar embarazada durante la terapia, o si tiene pensado amamantar o está amamantando a un bebé.

Hable con su profesional médico antes de disminuir la dosis o dejar de tomar RYTARY, ya que hacerlo podría provocar efectos secundarios graves. Llame de inmediato a su profesional médico si experimenta síndrome de abstinencia, incluidos síntomas como fiebre, confusión o rigidez muscular severa.

Tome RYTARY según las instrucciones. Usted puede tomar RYTARY con o sin alimentos; no obstante, tomar RYTARY con alimentos podría reducir o retrasar su efecto. Por tal motivo, procure tomar la primera dosis del día entre 1 y 2 horas antes de comer. Trague la cápsula de RYTARY entera; no la mastique, parta ni triture. Si tiene dificultades para tragar la cápsula, puede separar ambas mitades y esparcir todo el contenido de ambas mitades de la cápsula sobre una pequeña cantidad de puré de manzana (1 a 2 cucharadas). Consuma la mezcla de inmediato. No debe conservarse la mezcla del medicamento con el alimento para utilizarla más tarde.

Nota: Esta información tiene como finalidad ayudar a usar RYTARY de manera segura y eficaz. No constituye una divulgación sobre todos los posibles efectos adversos o deseados. Comuníquese a su profesional médico si tiene algún efecto secundario al tomar RYTARY. Este puede ajustar el medicamento para reducir esos efectos.

Para informar POSIBLES REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con Amneal Specialty, una división de Amneal Pharmaceuticals LLC, al 1-877-835-5472, o con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas siguientes y la [Información de prescripción médica completa](#). Para obtener más información, visite RYTARY.com y/o hable con su profesional médico.



RYTARY® es una marca registrada de Amneal Pharmaceuticals LLC.
© 2023 Amneal Pharmaceuticals LLC.
Distribuida por Amneal Specialty, una división de Amneal Pharmaceuticals LLC.
Todos los derechos reservados. PP-PAT-RYT-US-0334 11/2023

RYTARY
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg